

DESCRIPTION D'UN CÉTONIDE NOUVEAU DE MADAGASCAR

(COL. SCARABÆIDÆ),

PAR M. J. DESCARPENTRIES.

Euchroea Benezechi nov. sp.

♂. *Nigra, supra luteo-vestita; fronte medio nigra, nitida; clypeo antice elevato, sinuato, angulis rotundatis, lateribus fere parallelis, pronoto disco modice punctato, lateribus impunctatis; scutello acuto, nigro-marginato; elytris lineato-punctatis, punctis nigris, arcuatis; corpore subtus pedibusque nigris, nitidis; lateribus luteo-maculatis.*

Long. (*sine cap.*) 23,4 millimètres; lat. max. 14 millimètres.

Anarabé (forêt Tanala), septembre 1922.

Un mâle type.

Noir, brillant; dessus couvert d'un revêtement mat, jaune orangé, perforé par une ponctuation laissant voir la couleur du fond. Milieu du front noir, brillant, imponctué au sommet, quelques points près des yeux; clypéus à côtés rebordés, parallèles entre eux, son bord antérieur légèrement relevé, le rebord largement sinué en son milieu, les angles arrondis; antennes noires. Pronotum modérément ponctué sur le disque, sa ligne médiane et ses côtés à revêtement plus dense, ne laissant pas paraître de ponctuation. Écusson imponctué, à côtés noir brun, luisants, enfoncés en rainure. Élytres ayant, sur leur disque, des rangées assez bien alignées de points arqués, très atténués dans la région de l'écusson; côtés et sommet à revêtement plus épais et à ponctuation plus fine qui disparaît sous des taches assez larges de revêtement très épais; la première de ces taches située au niveau du premier segment ventral, la seconde au niveau du troisième, la dernière au sommet, laissant à découvert l'angle sutural densément striolé. Pygidium noir, impressionné et fortement striolé latéralement à sa base, portant cinq grandes taches imponctuées : une de chaque côté du milieu de sa base, une en arrière de chaque impression latérale, une plus large en arrière du milieu, avant le sommet; les intervalles entre ces taches à revêtement moins épais, densément perforé par une ponctuation arquée, plus dense en avant; sommet à pubescence noirâtre. Dessous noir, brillant, peu ponctué, portant des taches de la même nature que le revêtement du dessus, sur les côtés du sternum, des hanches postérieures

et des quatre premiers segments abdominaux; saillie mésosternale obtusément triangulaire, ses côtés nullement incurvés; ventre à peine déprimé; pattes à pubescence noire à leur bord interne; tibias antérieurs tridentés, la première dent obsolète.

A peu près de même couleur que *E. nigrostellata* Janson, mais sans taches noires sur les élytres; sinus du rebord du clypéus plus large, angles plus arrondis.

Ce rare Cétonide est dédié à mon ami Bénézech, planteur à Anarabé, qui a bien voulu m'abandonner gracieusement cet individu unique, provenant de ses chasses. J'ai déposé ce type dans les collections du Muséum.